



Patientenname _____

Telefonisches Monitoring - Coviderkrankung allgemein

Getestet: nein/ja

Dat. _____ Ergebnis _____

Datum	Atemnot ⁱ	HF	RR	Temp.	Husten, andere Symptome	Fatigue	Beklemmungsgefühl	Ernährung/ Appetit	Trinkmenge/ Harn	Gewicht	Psychische Verfassung-Vigilanz	Betreuung	Medikation Maßnahme

ⁱEmpfohlenes Vorgehen: Sprechpausen? kann der Patient längere Sätze sprechen? bis 30 zählen? was ist seine subjektive Einschätzung? Verlauf?
 Evtl. pO2, falls vorhanden.

Intervalle nach individueller Situation.

Bei Vorliegen von **zumindest 1 Risikofaktor: tägliches Monitoring** empfohlen.

Zwischen **6. – und 10. Erkrankungstag** jedenfalls **tägliches Monitoring** empfohlen!


Monitoring hinsichtlich Grundkrankheiten situationsabhängig!

Cut off für **Hausbesuch** z.B.:



- Verdacht auf: **Verschlechterung der Coviderkrankung**
- Verdacht auf: unzureichend kontrollierte **Grundkrankheit**
- Medikation nicht gesichert
- Betreuungssituation entgleisend/unsicher

Hospitalisierung ?



- „red flags“ - Hospitalisierung (frühzeitig!) erwägen - Zeichen für respiratorische, kardiale oder renale Insuffizienz:
 - Atemnot
 - Leistungsknick
 - Deutlich sinkender RR ohne korrigierbare Ursache (Medikation, Flüssigkeitsaufnahme)
 - Abnehmende Vigilanz bis Verwirrtheit
 - Retentionszeichen (Harnmenge ↓, Gewicht ↑, zunehmend Ödeme)
- **Betreuungssituation zu Hause kritisch - Hospitalisierung erwägen!**
 - Medikation / Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme nicht gesichert
 - Betreuungssituation entgleisend
 - Grundkrankheit entgleisend